암로디핀 단일제

사용상의주의사항

3. 이상반응

2) 시판 후 비교적 적은 빈도로 관찰된 이상반응은 다음과 같다.

피부/부속기계 : 탈모, 다한증, 자반병, 피부 변색, 두드러기, 독성표피괴사용해

5. 상호작용

7) 다른 약물들이 암로디핀에 미치는 영향 :

(5) CYP3A4 유도제: CYP3A4 유도제 (예, 리팜피신, 세인트 존스 워트 (hypericum perforatum))와의 병용투여는 암로디핀의 혈장농도를 변화시킬 수 있다. 그러므로 특히 강력한 CYP3A4 유도제와 병용투여하는 기간 및 그 이후에 혈압을 모니터링하고 용량 조절을 고려해야 한다.

암로디핀 단일제 및 복합제(경구) 허가사항 변경대비표

항 목	기 허 가 사 항	변 경 사 항
이상반응	(생략) 2) 시판 후 비교적 적은 빈도로 관찰된 이상반응은 다음과 같다. 피부/부속기계 : 탈모, 다한증, 자반병, 피부 변색, 두드러기, (추가) (생략)	(기허가사항과 동일) 2) 시판 후 비교적 적은 빈도로 관찰된 이상반응은 다음과 같다. 피부/부속기계 : 탈모, 다한증, 자반병, 피부 변색, 두드러기, 독성표피괴사용해 (기허가사항과 동일)
상호작용	(생략) 7) 다른 약물들이 암로디핀에 미치는 영향 : (5) ~~시토크롬~~ ~~CY~~P3A4 유도제: ~~시토크롬 P3A4 유도제가 암로디핀에 미치는 영향에 대한 시험은 수행되지 않았다. 시토크롬 CY~~P3A4 유도제 (예, 리팜피신, 세인트 존스 워트 (hypericum perforatum))와의 병용투여는 암로디핀의 혈장농도를 ~~감소~~시킬 수 있으므로, ~~병용시 주의하여 투여한다.~~ (생략)	(기허가사항과 동일) 7) 다른 약물들이 암로디핀에 미치는 영향 : (5) CYP3A4 유도제: CYP3A4 유도제 (예, 리팜피신, 세인트 존스 워트 (hypericum perforatum))와의 병용투여는 암로디핀의 혈장농도를 변화시킬 수 있다. 그러므로 특히 강력한 CYP3A4 유도제와 병용투여하는 기간 및 그 이후에 혈압을 모니터링하고 용량 조절을 고려해야 한다. (기허가사항과 동일)